

Задаци из другог дела градива за припрему предрока - смене 6 и 7

1. Написати једначину нормале на криву

$$y = \frac{\sqrt{x-1}}{\ln^2 \sqrt{x-1}}$$

у тачки у којој је $x = 10$.

2. За криву дату параметарски
- $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$
- наћи нагиб (извод) за
- $t = 2\pi/3$
- .

3. Израчунати граничне вредности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - x^2 \ln(1 + 1/x)), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{x^4}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^4 x}{x \sin 3x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{\sin x} \right)^{1/\operatorname{tg}^2 x},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \operatorname{arctg} x}{x^3}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x-2} \right)^{3x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}.$$

4. Наћи домен и асимптоте функције

$$y = \frac{2^x + 1}{2^x - 1}, \quad y = \sqrt{\frac{x^3}{x+1}} + x - 1.$$

5. Испитати ток и скицирати график функције

$$y = (2x - 1)e^{-1/x}, \quad y = \frac{\ln^2(x-2)}{x-2}, \quad y = \frac{\sqrt{x+2}}{\ln^2(x+2)}, \quad y = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2}}, \quad y = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2-1}},$$

$$y = x - 1 - \sqrt{x^2 - x}.$$

6. Апроксимирати функцију
- $\ln(1 + x - x^2)$
- Маклореновим полиномом четвртог степена.

7. Апроксимирати функцију

$$y = (x^2 - 1)e^{-2x}$$

Маклореновим полиномом четвртог степена и проценити грешку апроксимације на интервалу $[0, 1]$.

8. Апроксимирати функцију

$$y = \sqrt[5]{2x-1}$$

Тејлоровим полиномом степена 3 у околини тачке $a = 1$. Користећи овај полином приближно израчунати $\sqrt[5]{1,1}$ и проценити грешку.

9. Имплицитно дату функцију
- $y \cos y = x$
- , при чему је
- $y(0) = 0$
- , апроксимирати Маклореновим полиномом трећег степена.

Решења

1. Нека је $f(x) = \sqrt{x-1}$ и $g(x) = \ln^2 \sqrt{x-1} = \left(\frac{1}{2} \ln(x-1)\right)^2 = \frac{1}{4} \ln^2(x-1)$. Тада је $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$, $g'(x) = \frac{\ln(x-1)}{2(x-1)}$, па је

$$y' = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x-1}} \cdot \ln^2 \sqrt{x-1} - \sqrt{x-1} \cdot \frac{\ln(x-1)}{2(x-1)}}{\ln^4 \sqrt{x-1}} = \frac{\ln \sqrt{x-1} - 2}{2\sqrt{x-1} \ln^3 \sqrt{x-1}}.$$

Даље је $y'(10) = \frac{\ln 3 - 2}{6 \ln^3 3}$. Приметимо још да је $y(10) = \frac{3}{\ln^2 3}$. Заменом ових вредности у једначину нормале $y - y(10) = -\frac{1}{y'(10)}(x - 10)$ добијамо

$$y - \frac{3}{\ln^2 3} = \frac{6 \ln^3 3}{2 - \ln 3}(x - 10).$$

2. Овде је $dx/dt = 1 - \cos t$ и $dy/dt = \sin t$, па је $y'(x) = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$. Даље је $x(2\pi/3) = 3/2$ и $y'(3/2) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

3. а) Ако искористимо Маклоренов развој за функцију $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ кад $t \rightarrow 0$ (мало „о“ од $f(t)$ је функција за коју важи $o(f(t))/f(t) \rightarrow 0$ кад $t \rightarrow 0$ тј. $o(f(t))$ је занемарљиво мала у поређењу са $f(t)$) имамо

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x + \frac{1}{2} + o(1) \right) = \frac{1}{2}.$$

Алтернативно, задатак се може решити применом Лопиталовог правила. Ако уведемо смену $x = 1/t, t \rightarrow 0$, дати лимес се своди на

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} - \frac{\ln(1+t)}{t^2} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} \stackrel{\text{Л.П.}}{(0/0)} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+t)} = \frac{1}{2}.$$

- б) Задатак ћемо решити свођењем на познати лимес $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^4} \cdot \frac{\sin^4 \frac{x}{2}}{\sin^4 \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^4 \frac{x}{2}}{2^4 \left(\frac{x}{2}\right)^4} = \frac{1}{8}.$$

- в) Користимо Маклоренове развоје $\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ и $\sin t = t + o(t^2)$ кад $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^4 x}{x \sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)(1 + \cos^2 x)}{x \sin 3x} = 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2))}{x(3x + o(x^2))} = \frac{2}{3}.$$

г)

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\cos x} \right)^{1/\operatorname{tg}^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} \ln \frac{1}{\cos x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\ln \cos x}{\operatorname{tg}^2 x}}.$$

Применом Лопиталовог правила на последњи лимес добијамо

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x / \cos x}{2 \operatorname{tg} x / \cos^2 x}} = \sqrt{e}.$$

д)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \operatorname{arctg} x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x^2)^{-1/2} - (1+x^2)^{-1}}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(1-x^2)^{-3/2}(-2x) + (1+x^2)^{-2}2x}{6x} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

ђ) Користимо познати лимес $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x-2}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-2}\right)^{(x-2)\frac{3x}{x-2}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x-2}} = e^3.$$

е) Користимо Маклоренове развоје $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$ и $\ln(1+t) = t + o(t)$ кад $t \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(-\frac{x^2}{6} + o(x^2)\right) = -\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

4. а) Домен функције је $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Видимо да је

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{2^x + 1}{2^x - 1} = \pm\infty,$$

па је права $x = 0$ вертикална асимптота. Даље је

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 1}{2^x - 1} = -1,$$

тј. права $y = -1$ је хоризонтална асимптота кад $x \rightarrow -\infty$. Слично је

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^{-x}}{1 - 2^{-x}} = 1,$$

па је права $y = 1$ хоризонтална асимптота кад $x \rightarrow \infty$.

б) Домен ове функције је $\frac{x^3}{x+1} \geq 0$, тј. $(-\infty, -1) \cup [0, \infty)$. Права $x = -1$ је вертикална асимптота, јер је

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \sqrt{\frac{x^3}{x+1}} + x - 1 = \infty.$$

Да бисмо одредили понашање функције кад $x \rightarrow \pm\infty$, можемо користити Маклоренов полином функције $(1+t)^\alpha = 1 + \alpha t + o(t)$ кад $t \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{x^3}{x+1}} + x - 1\right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x\sqrt{1 - \frac{1}{x+1}} + x - 1\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x\left(1 - \frac{1}{2(x+1)} + o\left(\frac{1}{x+1}\right)\right) + x - 1\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2x - \frac{3}{2} + o(1)\right),\end{aligned}$$

па је права $y = 2x - \frac{3}{2}$ коса асимптота кад $x \rightarrow \infty$. Слично,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{\frac{x^3}{x+1}} + x - 1\right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x\sqrt{1 - \frac{1}{x+1}} + x - 1\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x\left(1 - \frac{1}{2(x+1)} + o\left(\frac{1}{x+1}\right)\right) + x - 1\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2} + o(1)\right),\end{aligned}$$

па је права $y = -\frac{1}{2}$ хоризонтална асимптота кад $x \rightarrow -\infty$.

5. Домен функције је $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, нула функције је $N(1/2, 0)$, $y < 0$ за $x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1/2)$ и $f(x) > 0$ за $x \in (1/2, \infty)$. Права $x = 0$ је вертикална асимптота са леве стране, јер је

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0 \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} y(x) = -\infty.$$







Кад $x \rightarrow \pm\infty$ можемо користити Маколоренов развој $e^t = 1 + t + o(t)$ кад $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (2x - 1)e^{-1/x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (2x - 1) \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (2x - 3 + o(1)),$$

па је права $y = 2x - 3$ коса асимптота кад $x \rightarrow \pm\infty$.

Даље је $y'(x) = e^{-1/x} \frac{2x^2 + 2x - 1}{x^2}$, па $y \nearrow$ за $x \in (-\infty, -(1 + \sqrt{3})/2) \cup ((\sqrt{3} - 1)/2, \infty)$ и $y \searrow$ за $x \in (-(1 + \sqrt{3})/2, 0) \cup (0, (\sqrt{3} - 1)/2)$. Тачка $(-(1 + \sqrt{3})/2, y(-(1 + \sqrt{3})/2))$ је локални максимум функције, а тачка $((\sqrt{3} - 1)/2, y((\sqrt{3} - 1)/2))$ је локални минимум функције.

Други извод је $y'' = e^{-1/x} \frac{4x - 1}{x^4}$, па је y конкавна за $x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1/4)$ и конвексна за $x \in (1/4, \infty)$. Функција има превој у тачки $(1/4, y(1/4))$.



6. Користимо познати развој $\ln(1 + t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + o(t^4)$ кад $t \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \ln(1 + x - x^2) &= x - x^2 - \frac{(x - x^2)^2}{2} + \frac{(x - x^2)^3}{3} - \frac{(x - x^2)^4}{4} + o((x - x^2)^4) \\ &= x - x^2 - \frac{1}{2}(x^2 - 2x^3 + x^4) + \frac{1}{3}(x^3 - 3x^4) - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \\ &= x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{7}{4}x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

7. Првих пет извода су $y'(x) = -2e^{-2x}(x^2 - x - 1)$, $y''(x) = 2e^{-2x}(2x^2 - 4x - 1)$, $y'''(x) = -4e^{-2x}(2x^2 - 6x + 1)$, $y^{(4)}(x) = 16e^{-2x}(x^2 - 4x + 2)$ и $y^{(5)}(x) = -32e^{-2x}(x^2 - 5x + 4)$. Даље је $y(0) = -1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = -2$, $y'''(0) = -4$ и $y^{(4)}(0) = 32$, па је Маклоренов полином четвртог степена

$$T_4(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!}x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \frac{y'''(0)}{3!}x^3 + \frac{y^{(4)}(0)}{4!}x^4, \quad \text{тј.} \quad T_4(x) = -1 + 2x - x^2 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{4}{3}x^4.$$

Грешка апроксимације је

$$R_4(x) = \frac{y^{(5)}(t)}{5!}x^5, \quad \text{за } t \in (0, x), \quad \text{при чему је } x \in [0, 1].$$

За оцену грешке, нађимо максимум функције $|y^{(5)}(t)|$ на интервалу $(0, 1)$:

$$\max_{t \in (0, 1)} |-32e^{-2t}(t^2 - 5t + 4)| < 32e^0 \cdot 4 = 128, \quad \text{па је } |R_4(x)| < \frac{16}{15} \quad \text{за } x \in [0, 1].$$

8. Прва четири извода су $y'(x) = \frac{2}{5}(2x-1)^{-4/5}$, $y''(x) = -\frac{16}{25}(2x-1)^{-9/5}$, $y'''(x) = \frac{288}{125}(2x-1)^{-14/5}$ и $y^{(4)}(x) = -8064/625(2x-1)^{-19/5}$. Тејлоров полином трећег степена у тачки $a = 1$ је

$$T_3(x) = y(1) + \frac{y'(1)}{1!}(x-1) + \frac{y''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{y'''(1)}{3!}(x-1)^3, \quad \text{тј.}$$

$$T_3(x) = 1 + \frac{2}{5}(x-1) - \frac{8}{25}(x-1)^2 + \frac{48}{125}(x-1)^3.$$

Даље је $y(1, 1) \approx T_3(1, 1) = 1,037184$. За $1 < t < 1,1$ је $(2t-1)^{-19/5} < 1$, па је

$$|R_3(1, 1)| < \frac{1}{4!} \frac{8064}{625} \cdot 0,1^4 \approx 5,4 \cdot 10^{-5}.$$

9. Диференцирањем (по x) једначине $y \cos y = x$ (y је функција која зависи од x) добијамо $y' \cos y - yy' \sin y = 1$, одакле је $y' = \frac{1}{\cos y - y \sin y}$. Даљим диференцирањем добијамо $y'' = (2 \sin y + y \cos y)y'^3$ и $y''' = (3 \cos y - y \sin y)y'^4 + 3(2 \sin y + y \cos y)y'^2 y''$. За $x = 0$ и $y = 0$ добијамо $y' = 1$, а затим $y'' = 0$ и $y''' = 3$. Дакле, Маклоренов полином трећег степена је $T_3(x) = x + \frac{1}{2}x^3$.

Рада М.Ђ.