


## Rešenje petog domaćeg zadatka iz Matematike 2

1. Površina koju treba izračunati prikazana je na slici 1. Prvo je potrebno naći presek krivih  $y = \ln x$  и  $y = \ln^2 x$ . Iz  $\ln x = \ln^2 x$  imamo  $\ln^2 x - \ln x = 0$ , odnosno  $\ln x(\ln x - 1) = 0$ , па је  $\ln x = 0$  или  $\ln x - 1 = 0$ , odakle sledi  $x = 1$  или  $x = e$ . Kada se odrede odgovarajuće vrednosti  $y$ , dobijamo da su presečne tačke  $(1, 0)$  и  $(e, 1)$ .



Slika 1: Površina koju treba izračunati u zadatku 1.

Ovde је  $y = \ln x$  „горња”, а  $y = \ln^2 x$  „доња” крива. Тражена површина се добија:

$$P = \int_1^e (\ln x - \ln^2 x) dx = \int_1^e \ln x dx - \int_1^e \ln^2 x dx = I_1 - I_2$$

Izračunajmo  $I_1$ , parcijalnom gde smo odabrali podintegralne funkcije na sledeći način:

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx, \quad v = \int dx \Rightarrow v = x$$

$$I_1 = \int_1^e \ln x dx = x \ln x \Big|_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1) = 1$$

slično i za  $I_2$ , odaberimo podintegralne funkcije:

$$u = \ln^2 x \Rightarrow du = \frac{2 \ln x}{x} dx, \quad v = \int dx \Rightarrow v = x$$

$$I_2 = \int_1^e \ln^2 x dx = x \ln^2 x \Big|_1^e - 2 \int_1^e \ln x dx = e - 2I_1 = e - 2$$

Konačno se dobija:

$$P = I_1 - I_2 = 1 - (e - 2) = 3 - e$$

2. Neka je

$$I = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(x+2)^2(x^2+1)}.$$

Razlomak u podintegralnom izrazu predstavlja pravu racionalnu funkciju i važi:

$$\frac{1}{(x+2)^2(x^2+1)} \equiv \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}.$$

Odnosno dve racionalne funkcije su identički jednake ako su im identički jednaki imenioci i brojioci:

$$\begin{aligned} 1 &\equiv A(x+2)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x+2)^2 \\ &\equiv A(x^3+2x^2+x+2) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+4x+4) \\ &\equiv Ax^3+2Ax^2+Ax+2A+Bx^2+B+Cx^3+4Cx^2+4Cx+Dx^2+4Dx+4D \\ &\equiv (A+C)x^3 + (2A+B+4C+D)x^2 + (A+4C+4D)x + (2A+B+4D) \end{aligned}$$

odakle se dobija sledeći sistem jednačina:

$$\begin{array}{rcl} A & + & C & = & 0 \\ 2A & + & \boxed{B} & + & 4C & + & D & = & 0 & \leftarrow^{-1} \\ A & + & & & 4C & + & 4D & = & 0 \\ 2A & + & B & + & & & 4D & = & 1 & \leftarrow_{+} \end{array} \sim \begin{array}{rcl} \boxed{A} & + & C & = & 0 & \leftarrow^{-1} \\ A & + & 4C & + & 4D & = & 0 & \leftarrow_{+} \\ & & -4C & + & 3D & = & 1 \end{array} \sim \begin{array}{rcl} \boxed{3C} & + & 4D & = & 0 & \leftarrow^{\frac{4}{3}} \\ -4C & + & 3D & = & 1 & \leftarrow_{+} \end{array} \sim D = \frac{3}{25}$$

Vraćajući vrednost za  $D$  u izbačene jednačine dobija se  $C = -\frac{4}{25}$ ,  $A = \frac{4}{25}$  i  $B = \frac{1}{5}$ . Osnovni integrali racionalne funkcije koji se dobijaju su:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 \left( \frac{\frac{4}{25}}{x+2} + \frac{\frac{1}{5}}{(x+2)^2} + \frac{-\frac{4}{25}x + \frac{3}{25}}{x^2+1} \right) dx \\ &= \frac{4}{25} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x+2} + \frac{1}{5} \int_{-1}^1 \frac{dx}{(x+2)^2} - \frac{2}{25} \int_{-1}^1 \frac{2x dx}{x^2+1} + \frac{3}{25} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2+1} \\ &= \frac{4}{25} I_1 + \frac{1}{5} I_2 - \frac{2}{25} I_3 + \frac{3}{25} I_4 \end{aligned}$$

Izračunajmo ih redom:

$$I_1 = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x+2} = \ln|x+2| \Big|_{-1}^1 = \ln 3 - \ln 1 = \ln 3$$

Posle smene  $x+2 = t \begin{cases} x=1 \Rightarrow t=3 \\ x=-1 \Rightarrow t=1 \end{cases} \Rightarrow dx = dt$ :

$$I_2 = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(x+2)^2} = \int_1^3 \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} \Big|_1^3 = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}$$

Kako je podintegralna funkcija u  $I_3$  neparna, a interval integracije simetričan, sledi:

$$I_3 = \int_{-1}^1 \frac{2x dx}{x^2+1} = 0$$

$$I_4 = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2+1} = \operatorname{arctg} x \Big|_{-1}^1 = \operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg}(-1) = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Konačno:

$$I = \frac{4}{25} \cdot \ln 3 + \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} - \frac{2}{25} \cdot 0 + \frac{3}{25} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{24 \ln 3 + 9\pi + 20}{150}$$

3. Ako se odaberu podintegralne funkcije na sledeći način:

$$u = \operatorname{arctg} x \Rightarrow du = \frac{dx}{1+x^2}, \quad v = \int dx \Rightarrow v = x$$

tada se može iskoristiti parcijalna integracija:

$$\int_0^1 \operatorname{arctg} x \, dx = x \operatorname{arctg} x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} 1 - 0 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} I_1$$

Posle smene  $1+x^2 = t \begin{cases} x=1 \Rightarrow t=2 \\ x=0 \Rightarrow t=1 \end{cases} \Rightarrow 2x \, dx = dt$  jednostavno se dobija rešenje  $I_1$ :

$$I_1 = \int_0^1 \frac{2x dx}{1+x^2} = \int_1^2 \frac{dt}{t} = \ln|t| \Big|_1^2 = \ln 2$$

Konačno tražena vrednost jednaka je:

$$I = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$$

4. Pre parcijalne integracije transformišimo podintegralnu funkciju na sledeći način:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x \cos x \, dx$$

i ako se odaberu na sledeći način podintegralne funkcije:

$$u = \cos^{n-1} x \Rightarrow du = (n-1) \cos^{n-2} x (-\sin x), \quad v = \int \cos x \, dx \Rightarrow v = \sin x$$

$$\begin{aligned} I_n &= \cos^{n-1} x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \sin^2 x \, dx \\ &= 0 + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x (1 - \cos^2 x) \, dx \\ &= (n-1) \left( \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx \right) \\ &= (n-1)(I_{n-2} - I_n) \end{aligned}$$

odakle sledi:

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

Primenjujući rekurentnu formulu:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} I_{n-6} = \dots \\ &= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{2}{3} I_1 & , n \in 2\mathbb{N} + 1 \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{3}{4} I_2 & , n \in 2\mathbb{N} \end{cases} \end{aligned}$$

gde su terminalni integrali:

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1 - 0 = 1$$

ili

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{2} \left( x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{2} - 0 + \sin \pi - \sin 0 \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{2} - 0 + 0 - 0 \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$



Konačno se može napisati:


$$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1 & , n \in 2\mathbb{N} + 1 \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{4} & , n \in 2\mathbb{N} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} & , n \in 2\mathbb{N} + 1 \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} & , n \in 2\mathbb{N} \end{cases}$$

5. Površina koju treba izračunati prikazana je na slici 2. Važi:


$$P = \int_0^{2\pi} y \, dx = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)(1 + \cos t) \, dt = \int_0^{2\pi} (1 - \cos^2 t) \, dt = \int_0^{2\pi} \left(1 - \frac{1 + \cos 2t}{2}\right) \, dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2t) \, dt = \frac{1}{2} \left( t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$$



Slika 2: Površina omeđena krivima  $y = 1 - \cos t$ ,  $x = t + \sin t$  na intervalu  $(0, 2\pi)$

6. Prelazeći na uopštene polarne koordinate  $x = ar \cdot \cos \varphi$ ,  $y = br \cdot \sin \varphi$  vidi sliku 3: jednačina



Slika 3: Elipsa sa polarnim koordinatama.

elipse postaje:

$$\frac{a^2 r^2 \cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{b^2 r^2 \sin^2 \varphi}{b^2} = 1$$

odakle je

$$r^2 = 1$$

Zbog očite simetrije, traženu površinu možemo izračunati kao četiri površine osenčenog dela na slici 3 prema formuli za površinu ravnog lika u polarnim koordinatama:

$$P = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} ab \cdot r^2 \, d\varphi = 2ab \int_0^{\pi/2} d\varphi = 2ab \cdot \varphi \Big|_0^{\pi/2} = 2ab \left( \frac{\pi}{2} - 0 \right) = ab\pi$$


7. Jednačina normale na krivu  $y = y(x)$  u tački  $M(x_0, y_0)$  je

$$y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(x - x_0)$$

Kako je  $y = x(x-1) = x^2 - x$ , to je  $y' = 2x - 1$ , pa je u datoj tački  $x_0 = 1$  i  $y_0 = 0$  jednačina normale:

$$y - 0 = -\frac{1}{2 \cdot 1 - 1}(x - 1) \Rightarrow y = 1 - x$$

kako je to prikazano na slici:



Presečne tačke parabole i normale nalazimo rešavanjem sistema jednačina:


$$y = x^2 - x, \quad y = 1 - x$$

pa su  $x$ -koordinate presečnih tačaka  $-1$  i  $1$ . Tražena površina je:

$$\begin{aligned} P &= \int_{-1}^1 (1 - x - (x^2 - x)) \, dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2) \, dx = 2 \left( x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 \\ &= 2 \left( (1 - 1^3/3) - (0 - 0^3/3) \right) = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Druga jednakost u gornjem izvođenju važi jer je podintegralna funkcija parna, a interval integracije simetričan u odnosu na koordinatni početak.

8. Polarna jednačina  $\rho = \varphi$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi]$  je jednačina spirale na slici:



Njena dužina luka je:

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\varphi = \int_0^{2\pi} \sqrt{\varphi^2 + 1} d\varphi$$


Na osnovu rađenog neodređenog integrala:

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$$

je

$$\begin{aligned} L &= \frac{2\pi}{2} \sqrt{(2\pi)^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln \left( 2\pi + \sqrt{(2\pi)^2 + 1} \right) - \left( \frac{0}{2} \sqrt{0^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln \left( 0 + \sqrt{0^2 + 1} \right) \right) \\ &= \pi \sqrt{4\pi^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln \left( 2\pi + \sqrt{4\pi^2 + 1} \right) \end{aligned}$$

9. Dužina luka parabole  $y = x^2$  za  $x \in [-a, a]$ , vidi sliku, je:




$$L = \int_{-a}^a \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_{-a}^a \sqrt{1 + (2x)^2} dx = 2 \int_0^a \sqrt{1 + (2x)^2} dx$$

Uvodeći smenu  $2x = t \begin{cases} x=a \Rightarrow t=2a \\ x=0 \Rightarrow t=0 \end{cases} \Rightarrow 2dx = dt$  dobijamo  $L = \int_0^{2a} \sqrt{1 + t^2} dt$ . Na osnovu korišćenog „tabličnog” integrala iz prethodnog zadatka:


$$L = \frac{2a}{2} \sqrt{(2a)^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln \left( 2a + \sqrt{(2a)^2 + 1} \right) = a \sqrt{4a^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln \left( 2a + \sqrt{4a^2 + 1} \right)$$

10. Rotacijom parabole  $y = x - x^2$  oko  $x$ -ose za  $x \in [0, 1]$  dobija se telo (vidi sliku) čija je zapremina:



$$V = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 (x^2 - 2x^3 + x^4) dx = \pi \left( \frac{x^3}{3} - 2\frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \pi \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) = \frac{\pi}{30}$$

11. Telo koje se dobija rotacijom oko  $x$ -ose krive  $y = \sin x$ ,  $x \in [0, \pi]$  je prikazano na slici 4.



Slika 4: Telo koje nastaje rotacijom krive  $y = \sin x$ ,  $x \in [0, \pi]$  oko  $x$ -ose.

Zapreminu dobijamo jednostavno

$$V = \pi \int_0^\pi y^2 dx = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \pi \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{\pi}{2}$$

12. Integral je nesvojstven jer je podintegralna funkcija, označimo je sa  $f(x)$ , neograničena u okolini tačaka 1 i 2 koje nisu u oblasti definisanosti podintegralne funkcije. Sledi:

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 f(x) \, dx + \int_1^2 f(x) \, dx + \int_2^3 f(x) \, dx \\
&= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_0^{1-\varepsilon_1} f(x) \, dx + \lim_{\substack{\varepsilon_2 \rightarrow 0 \\ \varepsilon_3 \rightarrow 0}} \int_{1+\varepsilon_2}^{2-\varepsilon_3} f(x) \, dx + \lim_{\varepsilon_4 \rightarrow 0} \int_{2+\varepsilon_4}^3 f(x) \, dx \\
&= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_0^{1-\varepsilon_1} \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x-2)}} + \lim_{\substack{\varepsilon_2 \rightarrow 0 \\ \varepsilon_3 \rightarrow 0}} \int_{1+\varepsilon_2}^{2-\varepsilon_3} \frac{dx}{\sqrt{-(x-1)(x-2)}} + \\
&\quad \lim_{\varepsilon_4 \rightarrow 0} \int_{2+\varepsilon_4}^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x-2)}}
\end{aligned}$$

Ako se iskoriste smene Ojlera, ili na neki drugi način, može se dobiti:

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x-2)}} &= \ln \left| 3 - 2x - 2\sqrt{(x-1)(x-2)} \right| + c \\
\int \frac{dx}{\sqrt{-(x-1)(x-2)}} &= -\arcsin(3 - 2x) + c
\end{aligned}$$

Tada se dobija:

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_0^{1-\varepsilon_1} \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x-2)}} &= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \ln \left| 3 - 2x - 2\sqrt{(x-1)(x-2)} \right| \Big|_0^{1-\varepsilon_1} \\
&= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \left[ \ln \left| 3 - 2(1 - \varepsilon_1) - 2\sqrt{(1 - \varepsilon_1 - 1)(1 - \varepsilon_1 - 2)} \right| - \right. \\
&\quad \left. \ln \left| 3 - 2\sqrt{2} \right| \right] \\
&= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \left[ \ln \left| 1 - 2\sqrt{\varepsilon_1(1 + \varepsilon_1)} \right| - \ln \left| 3 - 2\sqrt{2} \right| \right] = -\ln(3 - 2\sqrt{2})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{\substack{\varepsilon_2 \rightarrow 0 \\ \varepsilon_3 \rightarrow 0}} \int_{1+\varepsilon_2}^{2-\varepsilon_3} \frac{dx}{\sqrt{-(x-1)(x-2)}} &= \lim_{\substack{\varepsilon_2 \rightarrow 0 \\ \varepsilon_3 \rightarrow 0}} \left[ -\arcsin(3 - 2x) \right] \Big|_{1+\varepsilon_2}^{2-\varepsilon_3} \\
&= \lim_{\substack{\varepsilon_2 \rightarrow 0 \\ \varepsilon_3 \rightarrow 0}} \left[ -\arcsin(3 - 2(2 - \varepsilon_3)) + \arcsin(3 - 2(1 + \varepsilon_2)) \right] \\
&= -\arcsin(-1) + \arcsin(1) = \pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{\varepsilon_4 \rightarrow 0} \int_{2+\varepsilon_4}^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x-2)}} &= \lim_{\varepsilon_4 \rightarrow 0} \ln \left| 3 - 2x - 2\sqrt{(x-1)(x-2)} \right| \Big|_{2+\varepsilon_4}^3 \\
&= \lim_{\varepsilon_4 \rightarrow 0} \left[ \ln \left| 3 - 2 \cdot 3 - 2\sqrt{(3-1)(3-2)} \right| - \right. \\
&\quad \left. \ln \left| 3 - 2(2+\varepsilon_4) - 2\sqrt{(2+\varepsilon_4-1)(2+\varepsilon_4-2)} \right| \right] \\
&= \lim_{\varepsilon_4 \rightarrow 0} \left[ \ln \left| -3 - 2\sqrt{2} \right| - \ln \left| -1 - 2\varepsilon_4 - 2\sqrt{\varepsilon_4(1+\varepsilon_4)} \right| \right] \\
&= \ln(3 + 2\sqrt{2})
\end{aligned}$$

Konačno:

$$\begin{aligned}
I &= -\ln(3 - 2\sqrt{2}) + \pi + \ln(3 + 2\sqrt{2}) \\
&= \pi + \ln \frac{3 + 2\sqrt{2}}{3 - 2\sqrt{2}} \\
&= \pi + 2\ln(3 + 2\sqrt{2}) \\
&= \pi + 4\ln(1 + \sqrt{2})
\end{aligned}$$

13. Neka je  $I_3 = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x^3 e^{-x} dx$  i rešimo ga parcijalnim integracijama, gde je izabrano:

$$u = x^3 \Rightarrow du = 3x^2 dx, \quad v = \int e^{-x} dx = -e^{-x}$$

tada je:

$$\begin{aligned}
I_3 &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[ x^3 e^{-x} \Big|_{x=A}^{x=0} + 3 \int_0^A x^2 e^{-x} dx \right] \\
&= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[ 0 - A^3 e^{-A} + 3 \int_0^A x^2 e^{-x} dx \right] \\
&= -\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{A^3}{e^A} + 3 \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x^2 e^{-x} dx
\end{aligned}$$

Kako je  $e^A$  brže rastuća funkcija od bilo kog polinoma, tada je  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{A^3}{e^A} = 0$ . Konačno se dobija:

$$I_3 = 0 + 3 \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x^2 e^{-x} dx = 3 \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x^2 e^{-x} dx = 3 \cdot I_2$$

Primenjujući rekurentnu vezu vrednost integrala je:

$$I_3 = 3 \cdot I_2 = 3 \cdot 2 \cdot I_1 = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot I_0$$

gde je:

$$I_0 = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x^0 e^{-x} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-x} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} e^{-x} \Big|_{x=A}^{x=0} = 1 - \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^A} = 1$$

Sledi da je:

$$I_3 = \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx = 6$$

14. Kako je  $D_f = \mathbb{R} \times (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$  jednostavno nadimo potrebne izvode:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{y^2 + x^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \frac{-x}{y^2} = \frac{-x}{y^2 + x^2}$$

Drugi parcijalni izvodi su:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = y \cdot \frac{-1}{(y^2 + x^2)^2} \cdot 2x = \frac{-2xy}{(y^2 + x^2)^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right) = -x \cdot \frac{-1}{(y^2 + x^2)^2} \cdot 2y = \frac{2xy}{(y^2 + x^2)^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{-1 \cdot (y^2 + x^2) + x \cdot 2x}{(y^2 + x^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(y^2 + x^2)^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{1 \cdot (y^2 + x^2) - y \cdot 2y}{(y^2 + x^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(y^2 + x^2)^2} \end{aligned}$$

15. Da bi formirali matricu potrebni su sledeći prvi parcijalni izvodi:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 2 \cdot (x + y + z) \cdot 1 + 2 \cdot (x - y + z) \cdot 1 + 2 \cdot (x + y - z) \cdot 1 = 2(3x + y + z) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 2 \cdot (x + y + z) \cdot 1 + 2 \cdot (x - y + z) \cdot (-1) + 2 \cdot (x + y - z) \cdot 1 = 2(x + 3y - z) \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= 2 \cdot (x + y + z) \cdot 1 + 2 \cdot (x - y + z) \cdot 1 + 2 \cdot (x + y - z) \cdot (-1) = 2(x - y + 3z) \end{aligned}$$

i sledeći drugi parcijalni izvodi:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 6 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= 2 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} &= 2 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 6 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} &= -2 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= 6\end{aligned}$$

Tražena matrica je:

$$H = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & -2 \\ 2 & -2 & 6 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Na uobičajen način nađimo rang matrice  $H$ :

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & \boxed{1} \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array} \begin{array}{c} +1 \\ + \\ + \end{array} \sim \begin{bmatrix} 3 & 1 & \boxed{1} \\ 4 & \boxed{4} & 0 \\ -8 & -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array} \sim \begin{bmatrix} 3 & 1 & \boxed{1} \\ 4 & \boxed{4} & 0 \\ \boxed{-4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Odakle je  $\rho(H) = 3$ .

16. Nađimo:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot 2x = \frac{x}{r}$$

slično se nalaze i ostali parcijalni izvodi:

$$\begin{aligned}\frac{\partial r}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot 2y = \frac{y}{r} \\ \frac{\partial r}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} \left( \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot 2z = \frac{z}{r}\end{aligned}$$

Iskoristimo poznate formule:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial r} (r^\alpha) \cdot \frac{x}{r} = \alpha r^{\alpha-1} \cdot \frac{x}{r} = \alpha x r^{\alpha-2} \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial r} (r^\alpha) \cdot \frac{y}{r} = \alpha r^{\alpha-1} \cdot \frac{y}{r} = \alpha y r^{\alpha-2} \\ \frac{\partial F}{\partial z} &= \frac{\partial f}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial r} (r^\alpha) \cdot \frac{z}{r} = \alpha r^{\alpha-1} \cdot \frac{z}{r} = \alpha z r^{\alpha-2}\end{aligned}$$

Analizirajući prethodne izvode, može se uočiti da se parcijalni izvodi po  $y$  i  $z$  mogu odmah napisati koristeći se parcijalnim izvodom po  $x$ . Funkcija je takvog oblika - simetrična po



svim promenljivama. Iskoristimo ovu činjenicu za naredna računanja.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial F}{\partial x} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} (\alpha x r^{\alpha-1}) \\
 &= \alpha \frac{\partial}{\partial x} (x r^{\alpha-1}) \\
 &= \alpha \left[ \frac{\partial}{\partial x} (x) \cdot r^{\alpha-2} + x \cdot \frac{\partial}{\partial x} (r^{\alpha-2}) \right] \\
 &= \alpha \left[ 1 \cdot r^{\alpha-2} + x \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r^{\alpha-2}) \cdot \frac{\partial r}{\partial x} \right] \\
 &= \alpha \left[ r^{\alpha-2} + x \cdot (\alpha - 2) r^{\alpha-3} \cdot \frac{x}{r} \right] \\
 &= \alpha \left[ r^{\alpha-2} + (\alpha - 2) \cdot x^2 \cdot r^{\alpha-4} \right]
 \end{aligned}$$

Napišimo i ostale parcijalne izvode koristeći dobijeni parcijalni izvod:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} &= \alpha \left[ r^{\alpha-2} + (\alpha - 2) \cdot y^2 \cdot r^{\alpha-4} \right] \\
 \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} &= \alpha \left[ r^{\alpha-2} + (\alpha - 2) \cdot z^2 \cdot r^{\alpha-4} \right]
 \end{aligned}$$

Sledi da je traženi zbir:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} &= \alpha \left[ r^{\alpha-2} + (\alpha - 2) \cdot x^2 \cdot r^{\alpha-4} \right] + \\
 &\quad \alpha \left[ r^{\alpha-2} + (\alpha - 2) \cdot y^2 \cdot r^{\alpha-4} \right] + \\
 &\quad \alpha \left[ r^{\alpha-2} + (\alpha - 2) \cdot z^2 \cdot r^{\alpha-4} \right] \\
 &= \alpha \left\{ 3 \cdot r^{\alpha-2} + (\alpha - 2) \cdot r^{\alpha-4} \cdot [x^2 + y^2 + z^2] \right\} \\
 &= \alpha \left[ 3 \cdot r^{\alpha-2} + (\alpha - 2) \cdot r^{\alpha-4} \cdot r^2 \right] \\
 &= \alpha \left[ 3 \cdot r^{\alpha-2} + (\alpha - 2) \cdot r^{\alpha-2} \right] \\
 &= \alpha \cdot r^{\alpha-2} (3 + \alpha - 2) \\
 &= (\alpha + 1) \cdot \alpha \cdot r^{\alpha-2}
 \end{aligned}$$

17. Označimo sa  $u = u(x, y) = ax + by$ ,  $v = v(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$  tada je  $F(u, v) = f(x, y)$ .

Izračunajmo:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= a \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= b \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{v} \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot 2y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{v}\end{aligned}$$

Ako iskoristimo prethodno dobijene parcijalne izvode dobijamo:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u} \cdot a + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{x}{v} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u} \cdot b + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{y}{v}\end{aligned}$$

Izračunajmo:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial F}{\partial u} \cdot a + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{x}{v} \right) \\ &= a \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial F}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial F}{\partial v} \right) \cdot \frac{x}{v} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{v} \right) \\ &= a \cdot \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{\partial F}{\partial u} \right) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{\partial F}{\partial u} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right] \\ &\quad + \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{\partial F}{\partial v} \right) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{\partial F}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right] \cdot \frac{x}{v} \\ &\quad + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{x}{v} \right) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{x}{v} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right] \\ &= a \cdot \left( \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} \cdot a + \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} \cdot \frac{x}{v} \right) + \left( \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} \cdot a + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \cdot \frac{x}{v} \right) \cdot \frac{x}{v} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \left( 0 + \frac{-x}{v^2} \cdot \frac{x}{v} \right)\end{aligned}$$

Konačno se dobija:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = a^2 \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + 2a \cdot \frac{x}{v} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{x^2}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{x^2}{v^3} \cdot \frac{\partial F}{\partial v}$$

Slično se može pokazati da je:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = b^2 \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + 2b \cdot \frac{y}{v} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{y^2}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{y^2}{v^3} \cdot \frac{\partial F}{\partial v}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= a^2 \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + 2a \cdot \frac{x}{v} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{x^2}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{x^2}{v^3} \cdot \frac{\partial F}{\partial v} + \\
&\quad b^2 \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + 2b \cdot \frac{y}{v} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{y^2}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{y^2}{v^3} \cdot \frac{\partial F}{\partial v} \\
&= (a^2 + b^2) \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + \frac{2}{v} \cdot (ax + by) \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \\
&\quad \frac{1}{v^2} \cdot (x^2 + y^2) \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{1}{v^3} \cdot (x^2 + y^2) \cdot \frac{\partial F}{\partial v} \\
&= (a^2 + b^2) \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + 2 \frac{u}{v} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{1}{v} \cdot \frac{\partial F}{\partial v}
\end{aligned}$$

18. Pogodno je napisati da je:

$$\begin{aligned}
z &= \varphi(u) + \psi(v) = f(u, v) \\
u &= x + ay = u(x, y) \\
v &= x - ay = v(x, y)
\end{aligned}$$

gde je  $a \in \mathbf{R}$ . Iz postavke zadatka jednostavno se dobijaju sledeći potrebni izvodi:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 1$$

slično:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = a, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -a$$

a drugi parcijalni izvodi su jednaki nula.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

Po postavci je  $\varphi = \varphi(u)$  и  $\psi = \psi(v)$ , sledi:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial v} = 0, \quad \frac{\partial \psi}{\partial u} = 0 \tag{1}$$

a)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\
&= \frac{\partial}{\partial u} \left( \varphi(u) + \psi(v) \right) \cdot 1 + \frac{\partial}{\partial v} \left( \varphi(u) + \psi(v) \right) \cdot 1 \\
&= \frac{\partial}{\partial u} \left( \varphi(u) \right) + \frac{\partial}{\partial u} \left( \psi(v) \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \varphi(u) \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \psi(v) \right) \\
&= \frac{\partial \varphi}{\partial u} + 0 + 0 + \frac{\partial \psi}{\partial v} \\
&= \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \psi}{\partial v}
\end{aligned}$$

b) Slično kao pod a):

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\
 &= \frac{\partial}{\partial u} \left( \varphi(u) + \psi(v) \right) \cdot a + \frac{\partial}{\partial v} \left( \varphi(u) + \psi(v) \right) \cdot (-a) \\
 &= a \cdot \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left( \varphi(u) \right) + \frac{\partial}{\partial u} \left( \psi(v) \right) - \frac{\partial}{\partial v} \left( \varphi(u) \right) - \frac{\partial}{\partial v} \left( \psi(v) \right) \right] \\
 &= a \cdot \left( \frac{\partial \varphi}{\partial u} + 0 + 0 + \frac{\partial \psi}{\partial v} \right) \\
 &= a \cdot \left( \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \psi}{\partial v} \right)
 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \psi}{\partial v} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \psi}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \psi}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\
 &= \left[ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial u \partial v} \right] \cdot 1 + \left[ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial v \partial u} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2} \right] \cdot 1
 \end{aligned}$$

Kako iz (1) sledi da je:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial v \partial u} = 0, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial u \partial v} = 0$$

konačno se dobija:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \left[ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2} + 0 \right] \cdot 1 + \left[ 0 + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2} \right] \cdot 1 = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2}$$

19. Neka je  $r = x + y$  tada je:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = 1 \tag{2}$$

dok data funkcija ima oblik:

$$u = f(r) + y \cdot g(r)$$

Nađimo:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (f(r)) + y \cdot \frac{\partial}{\partial x} (g(r)) = \frac{\partial f}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial g}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial r} \cdot 1 + y \cdot \frac{\partial g}{\partial r} \cdot 1 = \frac{\partial f}{\partial r} + y \cdot \frac{\partial g}{\partial r}$$

slično se nalazi i izvod po  $y$ :

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (f(r)) + g(r) + y \cdot \frac{\partial}{\partial y} (g(r)) \\
 &= \frac{\partial f}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} + g(r) + y \cdot \frac{\partial g}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} \\
 &= \frac{\partial f}{\partial r} \cdot 1 + g(r) + y \cdot \frac{\partial g}{\partial r} \cdot 1 \\
 &= \frac{\partial f}{\partial r} + g(r) + y \cdot \frac{\partial g}{\partial r}
 \end{aligned}$$

Da bi izračunali potrebnu vrednost nađimo druge izvode:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial r} + y \cdot \frac{\partial g}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} \cdot 1 + y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r} \cdot 1 = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} + y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial r} + g(r) + y \cdot \frac{\partial g}{\partial r} \right) \\
 &= \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} \\
 &= \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} + \frac{\partial g}{\partial r} + y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r}
 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial r} + g(r) + y \cdot \frac{\partial g}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial r} + y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} + 2 \cdot \frac{\partial g}{\partial r} + y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} - 2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} &= \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} + y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r} \\
 &\quad - 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} - 2 \cdot \frac{\partial g}{\partial r} - 2y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r} \\
 &\quad + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} + 2 \cdot \frac{\partial g}{\partial r} + y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r} \\
 &= 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} + 2y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r} - 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial^2 r} - 2 \cdot \frac{\partial g}{\partial r} - 2y \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial^2 r} + 2 \cdot \frac{\partial g}{\partial r} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

20.

$$\nabla f = \left[ \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} \quad \frac{2}{3} y^{-\frac{1}{3}} \quad \frac{2}{3} z^{-\frac{1}{3}} \right]$$

Tačka  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  pripada datoj površi:

$$x_0^{\frac{2}{3}} + y_0^{\frac{2}{3}} + z_0^{\frac{2}{3}} = 4 \tag{3}$$

i vrednost gradijenta je:

$$\nabla(M_0) = \left[ \frac{2}{3} x_0^{-\frac{1}{3}} \quad \frac{2}{3} y_0^{-\frac{1}{3}} \quad \frac{2}{3} z_0^{-\frac{1}{3}} \right]$$


Formirajmo opšti oblik tangente ravni:

$$\Pi : \frac{2}{3}x_0^{-\frac{1}{3}}(X - x_0) + \frac{2}{3}y_0^{-\frac{1}{3}}(Y - y_0) + \frac{2}{3}z_0^{-\frac{1}{3}}(Z - z_0) = 0 \quad (4)$$

Transformišimo prethodnu jednačinu ravni u njen segmentni oblik:

$$\frac{X}{a} + \frac{Y}{b} + \frac{Z}{c} = 1$$

Na slici se vide potrebni odsečki.



$$\begin{aligned} \Pi &\Rightarrow x_0^{-\frac{1}{3}}(X - x_0) + y_0^{-\frac{1}{3}}(Y - y_0) + z_0^{-\frac{1}{3}}(Z - z_0) = 0 \\ &\Rightarrow x_0^{-\frac{1}{3}}X + y_0^{-\frac{1}{3}}Y + z_0^{-\frac{1}{3}}Z = x_0^{\frac{2}{3}} + y_0^{\frac{2}{3}} + z_0^{\frac{2}{3}} \\ &\Rightarrow x_0^{-\frac{1}{3}}X + y_0^{-\frac{1}{3}}Y + z_0^{-\frac{1}{3}}Z = 4 \end{aligned}$$

jer važi (3) odakle je:

$$\Pi \Rightarrow \frac{X}{4x_0^{\frac{1}{3}}} + \frac{Y}{4y_0^{\frac{1}{3}}} + \frac{Z}{4z_0^{\frac{1}{3}}} = 1$$

Odsečke smo dobili, saberimo njihove kvadrate:

$$\left(4x_0^{\frac{1}{3}}\right)^2 + \left(4y_0^{\frac{1}{3}}\right)^2 + \left(4z_0^{\frac{1}{3}}\right)^2 = 16 \cdot \left(x_0^{\frac{2}{3}} + y_0^{\frac{2}{3}} + z_0^{\frac{2}{3}}\right) = 16 \cdot 4 = 4^3$$

*Jelena Tomanović*

*Rada Mutavdžić*

*prof. dr Aleksandar Cvetković*

*prof. dr Slobodan Radojević*